



AST413 Gezegen Sistemleri ve Oluşumu
Ders 5: Zamanlama Yöntemleri – I
Pulsar Zamanlaması

Pulsar Zamanlaması Yöntemi



Etrafında Gezegen Olabileceğini Hiç Aklınıza Getirmeyeceğiniz Yıldız?

- ✓ **Nötron Yıldızları:** Evrende bildiğimiz en yoğun ($3.7 - 5.9 \times 10^7 \text{ kg/m}^3 \sim 2.6 - 4.1 \times 10^{14} d_{\text{Güneş}}$) ve en küçük yıldızlar ($M_{\text{ort}} \sim 2M_{\text{Güneş}}$, $1.1 - 3M_{\text{Güneş}}$, $R \sim 12-20 \text{ km}$)
- ✓ Nötron yıldızları oldukça kompakt ve sıcak ($6 \times 10^5 \text{ K}$) cisimlerdir. Daha fazla çökmelerine engel olan ise kuantum mekaniksel bir olgudur (**nötron basıncı**).
- ✓ Bazı nötron yıldızları kendi eksenleri etrafında dakikada 40000'den fazla tur atarlar (**pulsarlar = atarcılar**).
- ✓ Galakside sayılarının 10^8 (gözlenenlerin sayısı ~ 2000) civarında olduğu tahmin edilmekle birlikte pulsarlar gibi hızlı dönme göstermiyorlar ya da bir çift sistem üyesi ($\sim \%5$) değil iseler sadece termal emisyonlarının gözlenmesi oldukça güçtür (Hubble tarafından gözlenen RX J185635-3754 yegane istisna!).


Nötron Yıldızlarının Oluşumu

- ✓ Başlangıç kütlesi $8 M_{\text{Güneş}}$ 'in üzerinde olan yıldızlar çekirdeklerinde demire kadar tüm elementleri "yaktıktan" sonra çekirdekleri enerji üretmediği için zarftaki devasa kütleye karşı koyamaz ve çöker.
- ✓ Bu sırada çekirdek zarftan yağan materyalle Chandrasekhar limitini ($\sim 1.4 M_{\text{güneş}}$) aşınca elektron dejenerasyonu gerçekleşir ve dejenerasyon basıncı çekirdeği destekler.
- ✓ Bu süreç (basıncıdan bağımsız olarak) sıcaklığın 5×10^9 K'e kadar yükselmesine neden olur ve bu sıcaklıkta foton parçalanması (ing. photodisintegration) süreci başlar. Yüksek enerjili gamma ışınlarının demir çekirdeği alfa parçacıklarına ayrıştırdığı bu süreçle sıcaklık iyice tırmanır.
- ✓ Bu sıcaklıkta elektron ve protonlar birleşerek nötronları oluşturur
- ✓ Çekirdekteki yoğunluğun 4×10^7 kg/m³ 'ü aşmasıyla nötron basıncı çekirdeğin daha fazla çökmesini önler.
- ✓ Zarftan yağan madde Tip-II, Tip-Ib ve Tip-Ic süpernovalarını oluşturacak şekilde püskürtülür ve geriye kalan çekirdek bölgesi "nötron yıldızı" olarak adlandırılır.

Nötron Yıldızlarının Dönmesi

- ✓ Yıldızın dönme momentumunu devralan çekirdek artık çok küçük hacme sıkıştığı (yarıçapı oldukça küçük olduğu) için **açıl momentumunu ($J = mV \times r$) korumak üzere** çok hızlı dönmeye zorlanır.
- ✓ Yeni oluşan bir nötron yıldızı saniyede birkaç kez kendi etrafında döner. Çift sistemlerdeki nötron yıldızları ise diğer bileşenden madde transfer ettiği için daha da hızlı (saniyede birkaç yüz kez) dönebilir. (Detayına giremeyeceğimiz) bazı mekanizmalar zaman zaman bu hızın ciddi miktarda artmasına da neden olabilir. Nötron yıldızı enerjisini dönme kinetik enerjisinden alır.
- ✓ Yıldızla birlikte dönen manyetik alan enerji yayar (ing. magnetic dipole radiation) ve cisim enerjisinin bir kısmını kaybederek giderek daha yavaş döner (birkaç saniyede bir tur!).
- ✓ Çift kutuplu ve kuvvetli manyetik alan, kutuplara yakın bölgelerdeki parçacıkları oldukça hızlandırır; radyo ve X-ışın bölgesinde gözlenen ışımalara (pulse = atım) neden olur (ing. Synchrotron radiation).
- ✓ Dönme eksenini hizalanması zorunlu olmayan manyetik eksenin kutupları, dönme sırasında gözlemciye her yöneldiğinde, gözlemci radyo bölgede bir enerji artışı (atım) kaydeder. Bu atımlar periyodiktir ve dönemleri dönme dönemine eşittir. Bu şekilde atım gözlenen nötron yıldızlarına **pulsar (atarca)** diyoruz.
- ✓ Rekor, saniyede 716 tur ile PSR J1748-2446ad (Hessels vd. 2006) nötron yıldızına aittir.

Çift Yıldız Sistemlerindeki Nötron Yıldızları: Milisaniye Pulsarları



- Çift yıldız sistemlerinde Nötron yıldızının diğer bileşenden kütle transfer etmesi, onun açısal momentumunu korumak üzere daha da hızlı dönmesine neden olur ve tipik olarak saniyenin binde biri gibi bir zaman ölçeğinde bir dönen ve **milisaniye pulsarları** adını verdiğimiz cisimleri gözleriz!



Green Bank 300 foot t




15 Kasım 1988




Arecibo Radyo Teleskobu



1980'lerin sonunda pulsarlar üzerine arařtırmalarını Green Bank Radyo Teleskobu'nda srdren Alexander Wolszczan, radyo teleskobun zarar grmesi sonrası; arařtırmalarını tařıđı Arcibo'daki bakım alıřmaları sırasında teleskop sadece zenite bakabildiđi iin bařucundan geecek pulsarları gzlemek ve sayılarını belirlemek zere bir proje verdi.




Pulsarın defalarca gzlemi atım zamanının sinsoidal olarak deđiřtiđini ortaya koydu



Wolszczan & Frail, 1992

Işık-Zaman Etkisi (LiTE)



Romer Gecikmesi: Danimarkalı astronom Ole Romer 1676 yılında yaptığı iki farklı Io geçişi gözleminin yörünge mekaniği hesaplarıyla beklenenden 20 dakika farklı zamanlarda gerçekleştiğini farketti. Bu farkın Dünya ve Jüpiter'in yörüngelerini üzerindeki konumlarının değişimi kaynaklı olduğunu ve sonlu hızdaki ışığın aradaki yol farkını almak için de ekstra zaman geçeceğini düşünerek ışık hızını $c \sim 209000 \text{ km / s}$ buldu (modern değerden %30 küçük) .


Bir ötegezegen (m_g) kaynaklı olarak yıldızın yörünge hareketi sırasında ortak kütle merkezinden t anındaki uzaklığının gözlemcinin bakış doğrultusundaki izdüşümünü ışığın katetmesi için gereken zaman $O(t)$:

$$O(t) = \frac{G^{1/3} P^{2/3} (1 - e^2) m_g \sin i}{c (2\pi)^{2/3} (m_g + m_*)^{2/3}} \frac{\sin(\omega + \theta(t))}{1 + e \cos(\theta(t))}$$

<http://astro.unl.edu/classaction/animations/extrasolarplanets/pulsarPeriodSim001.html>

Pulsardan alınan atım sinyallerini kaydettiğimiz zaman, ancak pulsar bize yaklaşıp uzaklaşıyorsa düzenli olarak değişebilir! Çünkü ışık hızı sonludur ve Pulsar bize yakinken ondan aldığımız radyo sinyalleri ile uzakken aldıklarımız arasında bir zaman farkı oluşur. Bu fark **ışık-zaman etkisi** (ing. Light-Time Effect) ya da **Roemer gecikmesi** (ing. Roemer delay) olarak bilinir. Bu farkın düzenli olarak değişimi pulsarın bir yörünge hareketi yapıyor olduğu şeklinde yorumlanır. Bu yörünge hareketinin sebebi sisteme ancak ışınımı çok az olduğu için görülemeyen ilave bir bileşen olabilir. PSR1257+12'nin dönme dönemi değişimine yol açtığı öne sürülen ilave bileşen eğer bir yıldız olsaydı:

- i)** Daha büyük genlikli bir sinüs görmeliydik. Çünkü bir yıldız pulsara daha büyük bir yörünge hareketi yaptırırdı.
- ii)** Düşük genlikli üç sinüsün üstüste binmiş halini görmemeliydik.




Soru: Bir milisaniye pulsarı gözleyerek olalım. Bir günlük gözlemlerimizle atımların bize ulaşma zamanlarını ve dönemi hassas bir şekilde belirledik diyelim. Bir hafta sonra gözlem için tekrar teleskop başına geçiyoruz ve aldığımız sinyaller bir hafta öncekine göre tam olarak 1 mikrosaniye geç bize ulaşıyor. Gecikmenin pulsarın yörünge hareketinden kaynaklandığını düşünüyorsanız aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Pulsar bize bir hafta öncekinden 300 metre daha yakın olmalı
- b) Pulsar bize bir hafta öncekinden 300 metre daha uzak olmalı
- c) Pulsar bize bir hafta öncekinden 100 metre daha yakın olmalı
- d) Pulsar bize bir hafta öncekinden 100 metre daha uzak olmalı

Pulsar Gezegen Parametrelerinin Hesabı

Temel fizik yasalarına, basit matematiğe ve bazı yaklaşımlara dayalı olarak Nötron yıldızlarının etrafında dolaşan gezegenlerin özelliklerini anlamaya çalışalım. İşe kütle merkezinin tanımıyla başlayabiliriz. Yıldızla ilişkin parametreleri (*), gezegene ilişkin parametreleri ise (p) indisleriyle göstereyim.



Kütle merkezi tanımı:

$$m_* r_* = m_p r_p$$

Diğer taraftan merkezkaç kuvvetle kütle çekim birbirini dengelemeli ki cisim yörünge hareketi yapsın! Bu koşulu yandaki şekilde ifade edebiliriz:

$$\frac{m_* V_*^2}{r_*} = \frac{G m_* m_p}{(r_* + r_p)^2} = \frac{m_p V_p^2}{r_p}$$

Gezegenin ortak kütle merkezine uzaklığının (r_p) yıldızın ortak kütle merkezine uzaklığından (r_*) çok büyük olduğunu ($r_p \gg r_*$) dolayısı ile $r_p + r_* \rightarrow r_p$ olduğunu varsayarak bu eşitliğin sağ tarafında kütle çekimle gezegen üzerindeki merkezkaç kuvvetinin eşitliği ifadesini düzenleyecek olursak:

$$\frac{G m_*}{r_p^2} = \frac{V_p^2}{r_p} \Rightarrow r_p = \frac{G m_*}{V_p^2}$$



Gezegenin Yörünge Büyüklüğü (r_p)

Ayrıca gezegen ve yıldızın ortak kütle merkezi etrafındaki yörüngelerinin çembersel olduğu varsayımı altında yörünge dönemi (her iki cisim için de aynıdır: P) yazalım.

Şimdi bu ifadeyi gezegenin ortak kütle merkezine uzaklığını (bir başka deyişle yörüngesinin yarıçapını, r_p) veren ifadeye yerine koyalım.


Bu bizi Kepler'in 3. yasasına getirdi. Bu yasadaki hareketle gezegenin yörüngesinin yarıçapını bulabiliriz.

$$P = \frac{2\pi r_p}{V_p} \Rightarrow V_p = \frac{2\pi r_p}{P}$$

$$r_p = \frac{G m_*}{V_p^2} \Rightarrow r_p^3 = \frac{G m_* P^2}{4\pi^2}$$

$$r_p = \sqrt[3]{\frac{G m_* P^2}{4\pi^2}}$$

Burada P (yörünge dönemi) gezegen ve pulsar için eşittir. Pulsar'dan alınan sinyallerin yörünge hareketi nedeniyle değişiminin dönemi ($\Delta P_{*,rot}$) de bu döneme eşit olmalıdır. Zira pulsardan alınan radyo atım zamanları yıldızın ortak kütle merkezi etrafındaki yörünge hareketi nedeniyle düzenli olarak değişmektedir. Bu nedenle P , gözlemsel bir niceliktir ve pulsarın dönme döneminin (P_{rot}) değişiminin dönemine ($\Delta P_{*,rot}$) eşittir. m_* , nötron yıldızı modellerinden alınabilen model-bağımlı bir parametre olduğu için r_p , elde edilmiş olur.



Gezegenin Kütlesi (m_p)

Yine kütle merkezinin tanımından ve yörüngenin çembersel olduğu varsayımından hareketle gezegenin kütlesini de elde etmek mümkündür.

$$r_* m_* = r_p m_p \Rightarrow r_* = \frac{m_p r_p}{m_*}$$

Yörüngenin çembersel olduğu varsayımı yıldızın kütle merkezinin etrafındaki hızının (V_*) sabit olmasını gerektirir. Yukarıdaki eşitlikte elde edilen r_* bu ifadede yerine konursa;


$$V_* = \frac{2\pi r_*}{P} \Rightarrow V_* = \frac{2\pi}{P} \frac{m_p r_p}{m_*}$$

Bu eşitlikten gezegenin kütlesi çekilirse yandaki gibi bulunur. Yıldızın ortak kütle merkezi etrafındaki hızı (V_*) Doppler kayması gözlemlerinden elde edilebilen gözlemsel bir parametredir.


$$m_p = \frac{V_* m_* P}{2\pi r_p}$$


Burada r_p Kepler'in 3. yasası kullanılarak elde edilen çembersel bir yörünge için gezegenin yörünge büyüklüğünü veren yarıçapıdır. Yıldızın kütle merkezi etrafındaki hızı (V_*) ise yörüngenin çembersel ve yörünge eğim açısının $i = 90^\circ$ olduğu varsayımları altında yıldızın gözlemciye ne kadar yaklaşıp uzaklaştığının (r_*) belirlenmesiyle bulunabilir. Yıldızın dönem değişiminin genliği genellikle zaman biriminde verilir. Yıldızın kütle merkezi ile gözlemciye en yakın olduğu konum arasındaki zaman farkı (Δt) dönem değişiminin yarı genliği kadardır. Aradaki fark ışık hızının sonlu (c) olmasından kaynaklandığı için $r_* = c \Delta t$ kadardır. Buradan $V_* = (2\pi r_*) / P$ ile kolayca hesaplanabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta gerçekte gözlenen yörünge (r_{obs}) ile yıldızın ortak kütle merkezinin etrafındaki yörüngesinin (r_*) aynı olmak zorunda olmamasıdır.



r_{obs} , yörüngenin gözlemcinin bakış doğrultusundaki bileşenidir ve r_* 'a yörüngenin eğim açısı (yörünge düzleminin bakış doğrultusuna dik düzlemle yaptığı açı, i) ile bağlıdır.





Dolayısı ile kütle merkezi tanımından çekilen yıldızın yörünge büyüklüğünün (r_*) yerine gözlenen yörünge büyüklüğünün konması gereklidir.

$$r_* = \frac{m_p r_p}{m_*} \Rightarrow \frac{r_{obs}}{\sin i} = \frac{m_p r_p}{m_*}$$

Bu durumda bu ifadeden çekilen gezegenin kütlesi değil onun yörünge eğim açısının sinüsüyle çarpımıdır.

$$m_p \sin i = \frac{r_{obs} m_*}{r_p} \Rightarrow m_p \sin i = \frac{V_* m_*}{2\pi r_p} P$$

Bu nedenle bulabildiğiniz (ve kataloglardaki değerler) gezegen kütlesi değil, onun yörünge eğim açısının sinüsü ile çarpımıdır! Pulsar gezegenleri için yörünge eğim açısı dejenerasyonunu ortadan kaldırabilmenin bir yolu bulunmamaktadır. Yörünge eğim açısı 0 hariç (o vakit pulsar gözlemciye yaklaşıp uzaklaşmayacağı için dönme kaynaklı sinyalin dönemi değişmezdi) herhangi bir değer olabilir. Dolayısı ile bulunan kütle i 'ye bağlı olarak bir gezegen bileşeni ifade edebileceği gibi kahverengi cüce ($13 M_{jüp} < m_p < 80 M_{jüp}$) hatta bir yıldız bileşene de karşılık gelebilir ($M \geq 80 M_{jüp}$).

PSR B1257+12b

Wolszczan & Frail PSR B1257+12'nin zamanlama gözlemlerinden iki şeyi bulmuşlardı:

1. Pulsar sinyalinin ulaşma zamanının değişim dönemi : $P = 25.262 \pm 0.03$ gün
2. Değişimin yarı genliği: $A = 3.0 \pm 0.2 \mu\text{s}$ (Δt)

Nötron yıldızının ise kütesini biliyorlardı. ($\sim 1.4 M_{\text{Güneş}}$)

$$r_p = \sqrt[3]{\frac{G m_* P^2}{4\pi^2}} \Rightarrow r_p [AB] = \sqrt[3]{m_* [M_{\text{güneş}}] (P [yıl])^2} = \sqrt[3]{1.4 \left(\frac{25.262}{365.25}\right)^2} AB \Rightarrow r_p \approx 0.1885 AB$$

Her şeyi Kepler'in 3. yasasında yerine koyunca $r_p = 2.8 \times 10^{10} \text{ m} \sim 0.1885 AB$ buldular.

Sinyalin değişim genliği de onlara yörüngenin tam kenarından baktıkları ($i = 90$) varsayımı altında, yıldızın yörünge büyüklüğünü verdi ($r_* = c \Delta t$)

$$r_* = (3 \times 10^{-6} \text{ s}) \times (3 \times 10^8 \text{ m/s}) = 900 \text{ m}$$

$$m_p \sin i = \frac{r_{\text{obs}} m_*}{r_p} \Rightarrow m_p \sin i = \frac{900 \times 1.4 \times 1.99 \times 10^{30}}{0.1885 \times 149.6 \times 10^9} \Rightarrow m_p \sin i = 8.89 \times 10^{22} \text{ kg} \approx 0.015 M_{\text{yer}}$$

$M_{\text{güneş}} = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$, $M_{\text{yer}} = 5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$ alınmıştır.

Biz basit hesabımızı radyo atımlarında en büyük genlikli ($A = 3.0 \pm 0.2 \mu\text{s}$) sinüse neden olan gezegen için yaptık ve elde ettiğimiz sonuç bir gezegen içindi. Ancak PSR1257 + 12'nin radyo atımlarının dönem değişimi 3 sinüsün üstüste bindiği daha karmaşık bir yapıydı. Bulduğumuz sinüsü çıkardıktan sonra kalana bir sinüs uyumlaması daha yapıp aynı hesapları tekrarlasaydık 2., onu da çıkardıktan sonra kalana bir sinüs uyumlaması yapsaydık 3. gezegenin parametrelerini de elde edebilirdik. 3. ve son sinüs de çıkarılınca veri üzerinde zamanla bir değişim kalmayacaktı. Yanda sistemdeki 3 gezegen (b, c ve d) için ayrı ayrı verilen parametreler bu şekilde hesaplanmıştır.

PSR-B1257+12 Sistemi *

Keşif	1992 - 1994
d^*	1630 ly
P_{rot}	6.22 ms
$M_{b,c,d}$	0.02, 4.3, 2.9 M_{yer}
$P_{b,c,d}$	25, 66, 98 gün
b,c,d	0.19, 0.36, 0.46 AB

Tüm veriler <http://exoplanet.eu> adresinden alınmıştır

Cevap Bekleyen Sorular...

Table 1

Wolszczan, 2012, NewAR, 56, 2

Observed and derived parameters of the PSR B1257+12 planets.

Parameter	Planet a	Planet b	Planet c
Projected semi-major axis, x (ms)	0.0030(1)	1.3106(1)	1.4134(2)
Eccentricity, e	0.0 (assumed)	0.0186(2)	0.0252(2)
Epoch of pericenter, T_p (MJD)	49765.1(2)	49768.1(1)	49766.5(1)
Orbital period, P_b (d)	25.262(3)	66.5419(1)	98.2114(2)
Longitude of pericenter, ω (deg)	0.0	250.4(6)	108.3(5)
Mass (M_\oplus)	0.020(2)	4.3(2)	3.9(2)
Inclination, solution 1, i (deg)	...	53(4)	47(3)
Inclination, solution 2, i (deg)	...	127(4)	133(3)
Planet semi-major axis, a_p (AU)	0.19	0.36	0.46


- 1.** Bu üç gezegen Nötron Yıldızı'nın oluşumuna neden olan süpernovadan nasıl kurtuldular?
- 2.** Neden yörüngeleri (neredeyse) çembersel?
- 3.** Milisaniye pulsarının bu kadar hızlı dönmesine neden olan bileşen nerede?

Teori 1: Nötron Yıldızına DönüŖen BaŖ BileŖenin Gezegenleri Süpernovadan KurtulmuŖ Olabilir mi?

- ✓ Bu nötron yıldızı bir milisaniye pulsarı olduđuna göre bir çift sistem içerisinde evrimi sırasında diđer bileŖenden kütle transferi sonucu hızlanmış olmalı. Yani sistemde iki yıldız bulunmalı. Bu da eđer gezegenler süpernovadan önce oluŖmuş iseler biraz uzakta olmalarını gerektirir. Aksi takdirde süpernova onları hızla sistemin dıŖına atar.
- ✓ Çift sistemdeki birinci bileŖen (sonunda nötron yıldızına dönüŖen) evriminin sonlarına dođru bir kırmızı dev yıldız haline gelmiŖ olmalı ki bu durum çevredeki gezegenleri "yutacak" kadar büyüdüđü anlamına gelir!
- ✓ Ve sonunda bu yıldız süpernova patlamasıyla tüm üst katmanlarını uzaya saçarken nasıl olur da çevresindeki gezegenler bu patlamadan "kurtulur"?

Bakalım bir süpernova çevredeki bir gezegene ne yapabilir?

Gezegeni yıldızdan $D = 10^{11}$ m uzaklıkta çembersel bir yörüngede dolanan $r = 10^7$ m yarıçaplı bir küre olarak düşünersek ve süpernova patlamasının da $E = 10^{44}$ J gibi bir toplam enerji ürettiğini varsayarsak, bulmamız gereken bu enerjinin kaçta kaçının gezegene ulaşacağı ve bu miktarın ona ne yapacağıdır!



Süpernovadan yayılan enerjinin D uzaklıkta $4\pi D^2$ 'lik küresel bir alana dağılacığı, gezegenin süpernovaya bakan yüzeyinin alanı πr^2 olduğuna göre, gezegenin yüzeyine ulaşan toplam enerji:

$$\frac{E}{4\pi D^2} \pi r^2 = \frac{E}{4} \left(\frac{r}{D}\right)^2 = \frac{10^{44}}{4} \left(\frac{10^7}{10^{11}}\right)^2 = \frac{1}{4} 10^{36} J$$

Bu kadar enerji bir gezegene ne yapabilir?

Gezegene isabet eden enerji büyük ama gezegen de büyük! Dünya'yı dikkate alırsanız 6×10^{24} kg! Pulsarların biraz daha ağır gezegenlere sahip olabileceğini düşünerek 2×10^{25} kg'lık bir gezegenden bahsediyor olduğumuzu düşünelim!

$$\begin{array}{l} M_{yer} \approx 6 \times 10^{24} \text{ kg} \\ M_p \approx 2 \times 10^{25} \text{ kg} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Kütle başına} \\ \text{enerji} \end{array} \quad \frac{\frac{1}{4} 10^{36} \text{ J}}{2 \times 10^{25} \text{ kg}} = \frac{1}{8} 10^{11} \sim 10^{10} \text{ J/kg}$$

Şimdi bazı bastileştirmelerle bu kadar enerji örneğin birim kütlede bir **kayaya** ne yapar anlamaya çalışalım.

1. Kayanın erime sıcaklığının 1000 K olduğunu varsayalım.
2. Kayanın özgül ısı kapasitesinin 1000 J / kg K olduğunu varsayacak olursak **kayayı eritmek için** $1000 \times 1000 = 10^6$ J'e ihtiyaç duyulduğu sonucu çıkar!
3. Tabi kayayı bu sıcaklığa getirmemiz erimesi için yeterli değil bu faz değişikliği için kimyasal bağları da koparmamız lazım. Bunun için de 300 000 J/kg gerektiğini varsayalım. 2×10^{25} kg buz 2×10^{25} kg suya çevirmek için bu kadarlık bir enerjiye ihtiyaç duyarız.
4. Diyelim ki kaya 2000 K'de **kaynasın!** $2000 \times 1000 = 2 \times 10^6$ J de bunun için gerekli
5. Kayayı bu sıcaklığa getirdikten sonra bu kez fazını buhara dönüştürmek için 2×10^6 J'e ihtiyaç duyulur.

Bunların hepsini toplasak ($10^6 + 3 \times 10^5 + 2 \times 10^6 + 2 \times 10^6 = 5 \times 10^6$ J) bile süpernovadan gezegene gelen toplam enerji ($\sim 10^{10}$ J) çok daha büyüktür. Dolayısıyla elimizde kayayı buharlaştıracak kadar enerji mevcuttur! Bu yakınlıkta bir gezegenin olduğu yerde süpernovadan kurtulma şansı yoktur!

Soru: Bir asteroidin (küçük gezegen) Dünya'yla çarpışmak üzere olduğunu hayal edin! Asteroidi buharlaştırmak için lazer kullanmak gibi bir niyetiniz olsun. Asteroidin 100 kg'lık kütleyle 1000 J / kg K 'lik bir özgül ısı kapasitesine, -20 K 'lik sıcaklığa sahip olduğunu, 980 K 'de buharlaşacağını ve gelen tüm enerjiyi absorbe edeceğini (soğuracağını) varsayacak olursanız, niyetinizi gerçekleştirmek için ne kadar enerjiye ihtiyaç duyarsınız?

a) 98000 J'den az

b) 98000 J

c) 98 milyon J

d) 100 milyon J


e) 100 milyon J'den fazla

Teori 1: Süpernovadan Kurtuluş YOK!

- ✓ Diyelim ki gezegenler süpernovadan kurtulmuş olsunlar. Ancak başlangıçta onları yörüngelerinde tutan $\sim 10 M_{\text{güneş}}$ 'lik yıldızın yerinde $\sim 1.5 M_{\text{güneş}}$ 'lik bir yıldız duruyor.
- ✓ Bu kadar küçük kütleli bir yıldızın etrafında gezegenlerin açısal momentumlarını korumaları için son derece yüksek hızlara ulaşmaları gerekir ki bu (hesap ederseniz!) kaçış hızlarından da fazla olabileceği için gezegenler merkezdeki yıldızdan kurtulabilirler bile! Kaçış hızlarına ulaşmasalar dahi bu gezegenlerin son derece büyük dışmerkezlilik ve yarı-büyük eksen uzunluğuna sahip yörüngelerde dolaşıyor olmalarını bekleriz! Oysa ki gözlenen bu değildir!
- ✓ Her ne kadar sistemde ikinci bir yıldız olduğunu (başka türlü nötron yıldızının dönme hızını bu kadar arttıramıyoruz!) varsaydıysak ve o yıldızın da bu yörüngeler üzerinde bir etkisi olacaksa da bu yıldızı da bir türlü göremiyoruz!


Açıklayamadığımız pek çok problemin bulunduğu bu senaryo akla yatkın değil!

Teori 2: Gezegenler “Göremediğimiz” İkinci Yıldızdan Oluşmuş Olabilir Mi?



- ✓ Bu teoriye göre evrimini tamamlayan baş bileşen nötron yıldızına dönüştükten sonra başlangıçta daha küçük kütleli olan bileşen de evriminin son aşamasında dev bir yıldız haline gelir, Roche şişimini doldurur ve nötron yıldızına madde aktarmaya başlar. Aktarılan madde nötron yıldızının etrafına bir birikim diski şeklinde sarılr. Gezegenler yoldaş bileşenin maddesinden müteşekkil bu birikim diskinde oluşan “ikinci nesil gezegenler” dir. Birikim diski zamanla dağılınca bugün gözlediğimiz sistem ortaya çıkmış olabilir.
- ✓ Bu teori, ikinci yıldızın “gözlenemiyor” olmasını gayet iyi açıklıyor. Ama bunun için ikinci yıldızın kütlesi çok kritik, zira ikinci yıldız tamamen konvektif küçük kütleli bir yıldız olmazsa tüm kütlelerin dağılıp, nötron yıldızı etrafında bir disk oluşturması mümkün olmaz. Dolayısı ile teori sınırlı sayıda ikinci yıldız senaryosu için geçerlidir!
- ✓ Olası bir diğer açıklama kütle transfer eden nötron yıldızının bu nedenle yaydığı X-ışınlarının ikinci yıldız sonunda patlatacak kadar yüksek şiddete ulaşabilmesine dayanır!

Teori 3: Thorne-Zytkow Cismi



1. Bu teoriye göre başlangıçta baş bileşen olan kütleli yıldız nötron yıldızına dönüştükten sonra ikinci yıldız ve sistemin etrafında dönen gezegenler açısal momentumun konumu gereği nötron yıldızına yaklaşır.


2. Yoldaş bileşen de zamanla evrimleşip birbirlerine yaklaşmakta olan nötron yıldızı ve gezegenleri çepeçevre sarar ve maddesinin bir kısmını bu sisteme aktarır. Kalan madde zamanla uzaklaşır ve bugün gördüğümüz sistem oluşur.

Pulsar Gezegenleri Örnek – 1

B1620-26b



M4 Küresel Kümesi




Bir nötron yıldızı ve bir beyaz cüce çiftinin
etrafında bir gezegen: B1620-26b

Pulsar Gezegenleri Örnek – 2

J1719-1438

J1719-1438



Bailes et al 2011, Science, 333, 1717

Yörünge analizi, nötron yıldızının çok yakınında 2 saat yörünge dönemli ve Jüpiter kütlesinde bir gezegen olduğunu gösteriyor ancak bu kadar yakında tedirginlik kuvvetleri böyle büyük bir cismi parçalar!

Bu kütlenin kararlı kalması ancak küçük bir hacme sıkışmasıyla mümkün. Bu bir **elmas gezegen** olabilir mi? (Bu soruya zaman içinde yapılan çalışmalar "Hayır!" cevabını vermiştir!)

Kaynaklar

- ✓ Bailes, M., Bates, S. D.; Bhalerao, V., vd., 2011, "Transformation of a Star into a Planet in a Millisecond Pulsar Binary", *Science*, 333, 1717
- ✓ Beuermann, K. vd, 2010, "Two planets orbiting the recently formed post-common envelope binary NN Serpentis", *Astronomy & Astrophysics*, 521L, 60
- ✓ Deeg, H.J., vd., 2008, "Extrasolar planet detection by binary stellar eclipse timing: evidence for a third body around CM Draconis", *Astronomy & Astrophysics*, 480, 563
- ✓ Doyle, L.R., vd., 2011, "Kepler-16: A Transiting Circumbinary Planet", *Science*, 333, 1602
- ✓ Golovin, A.V., Pavlenko, E.P., 2005, "On The question of the Behavior of O-C Residuals of the Active Algol-Like Binary RZ Cassiopeiae", *he Journal of the American Association of Variable Star Observers*, 34, 46
- ✓ Hinse, T.C., vd., 2014, "Revisiting the proposed circumbinary multiplanet system NSVS 14256825", *Monthly Notices of The Royal Astronomical Society*, 438, 307
- ✓ Horner, J., vd., 2012, "A dynamical analysis of the proposed circumbinary HW Virginis planetary system", *Monthly Notices of The Royal Astronomical Society*, 427, 2812
- ✓ Lee, J.-W., vd., 2009, "The ddb+M Eclipsing System HW Virginis And Its Circumbinary Planets", *The Astronomical Journal*, 137, 3181
- ✓ Mazeh, T., vd. 2013, "Transit Timing Observations from Kepler. VIII. Catalog of Transit Timing Measurements of the First Twelve Quarters", *The Astrophysical Journal Supplement*, 208, 16
- ✓ Nesvorný, D., vd., 2013, "KOI-142, The King of Transit Variations, is a Pair of Planets near the 2:1 Resonance", *The Astrophysical Journal*, 777, 3
- ✓ Sigurdsson, S., Thorsett, S. E., 2005, "Update on Pulsar B1620-26 in M4: Observations, Models, and Implications", *Binary Radio Pulsars*, ASP Conference Series, Vol. 328, p213
- ✓ Steffen, J.H., vd., 2011, "The architecture of the hierarchical triple star KOI 928 from eclipse timing variations seen in Kepler photometry", *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 417, 31
- ✓ Silvotti, R., vd., 2007, "A giant planet orbiting the 'extreme horizontal branch' star V 391 Pegasi", *Nature*, 449, 189-191
- ✓ Wolf, M., Zejda, M., 2005, "Apsidal motion in southern eccentric eclipsing binaries: V539 Ara, GG Lup, V526 Sgr and AO Vel", *Astronomy and Astrophysics*, 437, 545
- ✓ Wolszczan, A., Frail, D. A., 1992, "A planetary system around the millisecond pulsar PSR1257 + 12", *Nature*, 355, 145-147
- ✓ Wolszczan, A., 2008, "Fifteen years of the neutron star planet research", *Physica Scripta*, Volume 130, Issue , id. 014005