




AST418 Gezegen Sistemleri ve Oluşumu


Ders 1 : Tarihçe ve
Temel Yasalar



Ötegezegen Biliminin Kısa Tarihi

Gezegen : Güneş etrafında **1)** kapalı bir yörüngede dolanan, başka bir cismin uydusu olmayan, **2)** kütleçekimi katı cisim kuvvetlerini yenecek ve cismi hidrostatik dengede (yaklaşık olarak küresel geometride) olmaya zorlayabilecek kadar büyük ancak nükleer tepkimelerle kendi enerjisini üretemeyen ($M < 13 M_{\text{jüp}}$) ve **3)** yörüngesini uyduları dışındaki, kendisiyle benzer kütlede cisimlerden temizlemiş gökcismi

IAU, Resolution 5-6, 2006




IAU'nun gezegen tanımındaki diğer koşulları sağlayıp yörüngesini temizlememiş olanlara **CÜCE GEZEĞEN** diyoruz: Ceres, Plüto, Eris, Makemake, Haumea! (ve olası başka binlercesi!)

Gezegen Cüce Gezegen Küçük Gezegen (Asteroid ve Kuyruklu yıldızlar)

Gezegenler



Cüce Gezegenler



Küçük Gezegenler



- ✓ **Ötegezegen:** Kütleleri döteryumu yakabilecek limit kütleden küçük (Güneş'in metal bolluğunda bir cisim için 13 Jüpiter kütlesi) ve hidrostatik dengede olabilecek kadar da büyük, yıldızların, kahverengi cücelerin veya yıldız kalıntılarının etrafında kapalı yörüngelerde dolanan, merkezi cismin kütlesine oranı 1/25'ten küçük (L_4 ve L_5 noktalarının kararlı olduğu, böylece yörüngesini "temizlemiş") olan gök cisimleridir. (IAU -F2, 2018)
- ✓ Kopernik (ya da Sıradanlık) İlkesi: "Güneş sıradan bir yıldız ve Dünya da sıradan bir gezegen."
- ✓ Aslında çok uzun zamandır Güneş'ten başka yıldızların etrafında da gezegenler olabileceğini biliyoruz (Plato!) ama keşfetmemiz biraz zaman aldı...
- ✓ Çünkü Yıldız çok büyük ve Gezegen onun yanında çok küçük. Bir atom bombasının yakınında bir lazer ışığı kadar da sönük! Ve bizden çok çok çok çok çok çok uzaktalar!
- ✓ İlk gezegeni (iki tane birden!) ancak 1992 yılında bir yıldız kalıntısının (PSR B1257+12) etrafında zamanlama tekniğiyle bulabildik.*

PSR-B1257+12 Sistemi *

Keşif	1992 - 1994
d^*	1630 ly
P_{rot}	6.22 ms
$M_{b,c,d}$	0.00007 ($1.8 M_{\text{Ay}}$), 0.013, 0.012 $M_{\text{jüp}}$
$P_{b,c,d}$	25, 66, 98 gün
b,c,d	0.19, 0.36, 0.46 AB

Tüm veriler <http://exoplanet.eu> adresinden alınmıştır

PROPOSAL FOR A PROJECT OF HIGH-PRECISION STELLAR RADIAL VELOCITY WORK

By Otto Struve

With the completion of the great radial-velocity programmes of the major observatories, the impression seems to have gained ground that the measurement of Doppler displacements in stellar spectra is less important at the present time than it was prior to the completion of R. E. Wilson's new radial-velocity catalogue.

One of the burning questions of astronomy deals with the frequency of planet-like bodies in the galaxy which belong to stars other than the Sun.

But there seems to be no compelling reason why the hypothetical stellar planets should not, in some instances, be much closer to their parent stars than is the case in the solar system. It would be of interest to test whether there are any such objects.

We know that *stellar* companions can exist at very small distances. It is not unreasonable that a planet might exist at a distance of 1/50 astronomical unit, or about 3,000,000 km. Its period around a star of solar mass would then be about 1 day.

We can write Kepler's third law in the form $V^3 \sim \frac{1}{P}$. Since the orbital velocity of the Earth is 30 km/sec, our hypothetical planet would have a velocity of roughly 200 km/sec. If the mass of this planet were equal to that of Jupiter, it would cause the observed radial velocity of the parent star to oscillate with a range of ± 0.2 km/sec—a quantity that might be just detectable with the most powerful Coudé spectrographs in existence. A planet ten times the mass of Jupiter would be very easy to detect, since it would cause the observed radial velocity of the star to oscillate with ± 2 km/sec. This is correct only for those orbits whose inclinations are 90° . But even for more moderate inclinations it should be possible, without much difficulty, to discover planets of 10 times the mass of Jupiter by the Doppler effect.

Otto Struve (1952)

Otto Struve 1952 yılında, dikine hız yöntemiyle o günün olanakları ile dahi Güneş benzeri bir yıldızın etrafında 0.02 AB yarı büyük eksen uzunluklu bir yörüngede dolanan $1 M_{\text{jüp}}$ kütleli bir gezegenin ($K \sim 200$ m/s) bulunabileceğini öngörmüştür.

There would, of course, also be eclipses. Assuming that the mean density of the planet is five times that of the star (which may be optimistic for such a large planet) the projected eclipsed area is about 1/50th of that of the star, and the loss of light in stellar magnitudes is about 0.02. This, too, should be ascertainable by modern photoelectric methods, though the spectrographic test would probably be more accurate. The advantage of the photometric procedure would be its fainter limiting magnitude compared to that of the high-dispersion spectrographic technique.

Hatta bu gezegenlerin geçiş yöntemiyle ($\delta \sim 0.02$) dahi keşfedebileceğini de düşünmüştür.



- ✓ Güneş benzeri bir yıldız etrafında ilk gezegen (51 Peg b)* 1995'te dikine hız tekniğiyle keşfedildi.
- ✓ Yıldızının önünden geçerken "farkedilen" ilk gezegenler: HD209458b (Osiris)** ve OGLE-TR-56b***
- ✓ Bugün itibarı ile 4153 sistemde toplam 5634**** gezegen keşfetmiş durumdayız ve daha binlerce de aday cisim var!
- ✓ Üstelik Merkür büyüklüğündeki gezegenlerden, süper Dünyalar ve mini Neptünlere varana dek büyük bir ötegezegen çeşitliliğiyle de karşı karşıyayız!

* Mayor & Queloz (1995)
** Charbonneau vd. (2000)
*** Konacki vd. (2003)
**** 24 Şubat 2024



THE NOBEL PRIZE IN PHYSICS 2019




James
Peebles

"fiziksel
kozmozjideki
teorik keşifler"

Michel
Mayor

"Güneş benzeri bir yıldız etrafında
keşfedilen ilk ötegezegen"

Didier
Queloz



- 
- ✓ Dünya benzeri gezegenler bulmayı umuyorduk ama ilk bulduğumuz gezegenler daha çok Jüpiter'e benziyordu!
 - ✓ Yıldızının burnunun dibinde dolanan Jüpiter'in birkaç katı kütleye sahip dev gaz gezegenler!
 - ✓ Bu gezegenler hala kafamızı karıştırıyor. Biz gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğunu biliyor ama Dünya benzeri gezegenler olup olmadığını merak ediyorduk.
 - ✓ Şimdi Dünya benzeri gezegenlerin var olduğunu bulduk ama gezegen sist

Neredeyse Aklımıza Gelen Her Yöntemle Gezegen Bulduk!

- ✓ Pulsar zamanlaması yöntemiyle (3'ü aynı cismin -PSR B1257 +12b,c,d- etrafında 19 sistemde toplam **22 tane (+0)**)
- ✓ Dikine hız yöntemiyle (822 sistemde toplam **1100 tane (+70)**)
- ✓ Geçiş yöntemiyle (2940 sistemde toplam **3888 tane (+168)**)
- ✓ Doğrudan görüntüleme yöntemiyle (138 sistemde toplam **237 tane (+20)**)
- ✓ Çekimsel mercek yöntemiyle (256 sistemde **278 tane (+51)**)
- ✓ Çift yıldız zamanlama yöntemiyle (21 sistemde **31 tane (+0)**)
- ✓ Gezegen geçiş zamanlama yöntemiyle (25 sistemde **29 tane (+3)**)
- ✓ Astromi yöntemiyle (2 sistemde 2 tane) – **Gaia ile belki binlerce !**

Tüm sayılar exoplanet.eu kataloğundan alınmış olup 20 Şubat 2024 tarihi itibarı ile günceldir.

HD208897b, Yılmaz vd. 2017



Parameter	TUG+OAO	OAO	TUG
P (days)	352.7 ± 1.7	349.7 ± 3.3	353.6 ± 2.7
K_1 (ms^{-1})	34.7 ± 2.2	28.9 ± 1.2	42.7 ± 5.5
e	0.07 ± 0.06	0.04 ± 0.03	0.15 ± 0.11
ω (deg)	167 ± 83	297 ± 64	89 ± 42
V_0 (ms^{-1})	12.1 ± 1.8	14.1 ± 0.9	11.2 ± 3.8
T_p (BJD-2450000)	5036 ± 82	6961 ± 54	4971 ± 46
$m_2 \sin i$ (M_J)	1.40 ± 0.08	1.16 ± 0.05	1.70 ± 0.18
a (AU)	1.05 ± 0.03	1.04 ± 0.03	1.05 ± 0.03
$f_1(m)$ ($10^{-9} M_\odot$) ..	1.5 ± 0.3	0.8 ± 0.1	1.7 ± 0.6
$a_1 \sin i$ (10^{-3}AU) ..	1.1 ± 0.1	0.9 ± 0.2	1.4 ± 0.3
σ_{jitter} (ms^{-1})	12.0	4.0	12.0
ΔRV (ms^{-1})	13.63	-	-
N_{obs}	107	34	73
RMS (ms^{-1})	18.13	4.81	20.54
Reduced $\sqrt{\chi^2}$	0.95	0.96	1.01

Monthly Notices

of the Royal Astronomical Society



Royal
Astronomical
Society

Issues ▾ Advance articles Submit ▾ Purchase Alerts About ▾

All Monthly Notices of the ▾



Advanced
Search



Volume 511, Issue 4
April 2022
(In Progress)

Article Contents

ABSTRACT

1 INTRODUCTION

2 OBSERVATIONS AND DATA

3 LIGHT-CURVE MODELLING

4 ECLIPSE TIMINGS ANALYSIS

5 DYNAMICAL STABILITY OF
THREE PLANET MODEL

6 CONCLUSIONS

Detection of two additional circumbinary planets around Kepler-451

Ekrem Murat Esmer ✉, Özgür Baştürk, Selim Osman Selam, Sinan Aliş

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 511, Issue 4, April 2022, Pages 5207–5216, <https://doi.org/10.1093/mnras/stac357>

Published: 10 February 2022 Article history ▾

“ Cite ✎ Permissions ↗ Share ▾

ABSTRACT

We announce the detection of two new planetary-mass companions around Kepler-451 binary system in addition to the one detected previously based on eclipse timing variation analysis. We found that an inner planet with 43 d period with a minimum mass of $1.76 M_{\text{Jup}}$ and an outer one with a ~ 1800 d orbital period with a minimum mass of $1.61 M_{\text{Jup}}$ can explain the periodic variations in the residuals of the one-planet fit of the eclipse timings. We updated the orbital period of the middle planet as 406 d, and determined its eccentricity as 0.33. The newly discovered outer planet is also on an eccentric orbit (0.29), while the innermost planet was assumed to have a circular orbit. All three Jovian planets have similar masses, and our dynamical stability test yields that the system is stable.



Advertisement



View Metrics


Email alerts

Article activity alert

Advance article alerts


New issue alert

In progress issue alert



KELT-18b, McLeod et al. 2017








© KELT Follow-Up Network

KPS-1b

Burdanov vd. (2018)



A Fourth Planet in the Kepler-51 System Revealed by Transit Timing Variations

Kento Masuda^{1,†} , Jessica E. Libby-Roberts^{2,3,†} , John H. Livingston^{4,5,6} , Kevin B. Stevenson⁷ , Peter Gao⁸ , Shreyas Vissapragada⁹ , Guangwei Fu¹⁰ , Te Han¹¹ , Michael Greklek-McKeon¹² , Suvrath Mahadevan^{3,2} , Eric Agol¹³ , Aaron Bello-Arufe¹⁴ , Zachory Berta-Thompson¹⁵ , Caleb I. Cañas^{16,52} , Yayaati Chachan^{17,18,52} , Leslie Hebb^{19,20} , Renyu Hu^{12,14} , Yui Kawashima^{21,22,23} , Heather A. Knutson²⁵ , Caroline V. Morley²⁴ , Catriona A. Murray¹⁵ , Kazumasa Ohno²⁵ , Armen Tokadjian¹⁴ , Xi Zhang²⁶ , Luis Welbanks²⁷ , Matthew C. Nixon²⁸ , Richard Freedman²⁹ , Norio Narita^{4,30,31} , Akihiko Fukui^{30,31} , Jerome P. de Leon³² , Mayuko Mori³³ , Enric Palle³⁴ , Felipe Murgas^{34,35} , Hannu Parviainen^{34,35} , Emma Esparza-Borges^{34,35} , Daniel Jontof-Hutter³⁶ , Karen A. Collins³⁷ , Paul Benni³⁸ , Khalid Barkaoui^{34,39,40} , Francisco J. Pozuelos⁴¹ , Michaël Gillon³⁹ , Emmanuël Jehin⁴² , Zouhair Benkhaldoun⁴³ , Suzanne Hawley⁴⁴ , Andrea S. J. Lin^{3,2} , Guðmundur Stefánsson⁴⁵ , Allyson Bieryla³⁷ , Mesut Yilmaz^{46,47} , Hakan Volkan Senavci^{46,47} , Eric Girardin⁴⁸ , Giuseppe Marino⁴⁹ , and Gavin Wang⁵⁰ 

¹Department of Earth and Space Science, Osaka University, Osaka 560-0043, Japan; kmasuda@ess.sci.osaka-u.ac.jp





Figure 12. Transit of Kepler-51d observed from the AUKR observatory (g' and r' filters), the TRAPPIST-North telescope ($I + z$ filter), the Acton Sky Portal observatory (blue blocking clear Astrodon filter), and FLWO KeplerCam (Sloan i) on UT 2020 August 18. The format of this figure is the same as that of Figure 6.

Her Türden Yıldızın Etrafında Gezegen Bulduk!

- ✓ Nötron yıldızlarının (PSR B1257+12b,c)
- ✓ Güneş benzeri yıldızların (51 Peg b)
- ✓ Kırmızı cücelerin (Gliese 876b, Proxima b)
- ✓ Beyaz cücelerin (WD 1856+534 b)
- ✓ Kahverengi cücelerin (2M1207 b)
- ✓ Dev yıldızların (Iota Dra b)
- ✓ Çok sıcak yıldızların (NSVS 1425 (AB), 42000 K)
- ✓ Başıboş gezenler (kahverengi cüce altı cisimler) bile bulduk (PSO J318.5-22 (Liu vd. 2013), SDSS J111010.01 +011613.1 (Gagne vd. 2015))

Çoklu Yıldız Sistemi Gezegenleri Tattoine'ler

- ✓ Çift sistemlerin etrafında (Kepler-451 b,c,d)
- ✓ Çift sistem üyelerinden birinin etrafında (55 Cnc b)
- ✓ Üçlü bir yıldız sisteminde (16 Cygni Bb)
- ✓ Dörtlü bir yıldız sisteminin iki üyesinin etrafında (Kepler 64b)
- ✓ Hatta dörtlü bir yıldız sistemindeki yıldızlardan birinin etrafında (30 Ari BAb)

- 
- ✓ Çok **yakınımızda** (4.3 ışık yılı) gezegenler (Proxima b,d)
 - ✓ Çok **uzağımızda** (27700 ışık yılı) SWEEPS-04 b
 - ✓ Çok **"ağır"** gezegenler de (J082303.1-491201b – $28 M_{\text{Jüp}}$) bulduk, çok **"hafiflerini"** (PSR B1257+12b – $0.02 M_{\text{Jüp}}$) de
 - ✓ Çok **büyükler** de (HAT-P-52b – $2.04 R_{\text{Jüp}}$) var, çok **küçükler** de (Kepler 37b – $0.30 R_{\text{Yer}}$)...
 - ✓ Yeterince büyük bir havuza koysanız **"yüzebilecekler"** (Kepler 51c – 0.03 g/cm^3) bile bulduk!
 - ✓ Bir yılı Dünya yılı ile **163 000 yıl** (GU Psc b) sürenler mi istersiniz, **5.8 saat** (Kepler 70b, aynı zamanda en sıcak: $\sim 7100 \text{ K}$) sürenler mi?

Ötegezegen İsimlendirmeleri

Tanımı gereği başka bir cismin etrafında bulunduğu için ötegezegenlerin isimlendirmelerinde bu cismin (yıldız, yıldız kalıntısı ya da kahverengi cüce) kataloglarda sık kullanılan isminin yanına (“a” harfini merkezi cisme bırakarak) Latin alfabesinin küçük harfleri b, c, d, ... harfleri kullanılır. Bir sistemde ilk keşfedilen gezegen “b” harfiyle gösterilirken, ikincisi “c”, üçüncüsü “d” şeklinde isim verilir. Büyük harfler (A,B,AB,C,...) ise yıldız ya da kahverengi cüce bileşenler için kullanılır.

Örnekler:

- **Yıldız isimleri ile adlandırılanlar:** Proxima b, Barnard b, Teegarden b...
- **Parlaklık Sıralaması ile adlandırılanlar:** Beta Pic b, 51 Peg b, tau Cet b...
- **Değişen yıldız isimleriyle adlandırılanlar:** AU Mic c, CI Tau b, V839 Sco b...
- **Araştırmanın ismiyle adlandırılanlar:** WASP-43 b, Kepler-220 d, TOI 1052 b (TESS Object of Interest), Qatar-10 b, HAT-P-23 b, XO-3 b, TrES-4 b, CoRoT-2 b, KPS-1 b...
- **Katalog ismiyle adlandırılanlar:** HD 208897 b, HD 209458 b, GJ 667 C c, OGLE-2007-BLG-349L AB c
- **Sonradan adlandırılanlar:** HD 209458 b: Osiris, 51 Peg b: Dimidium, WASP-52 b: Göktürk...

Kepler-9 c



Yıldızın
adı



Bu sistemde
keşfedilen 2.
gezegen

GJ 667C c



Üçlü yıldız
sistemi
GJ667'nin 3.
bileşeni (C)



Bu bileşenin
etrafında
keşfedilen 2.
gezegen (c)

HIP 79098 AB b




Çift yıldız sisemi
HIP 79098'in her iki
bileşeninin (AB)
etrafında



Bu sistemde
keşfedilen ilk
gezegen (b)

HR 8799 Planetary System (Sept. 2008)



0.5 arcsec
20 AU

Ötegezegen Araştırmalarının Cevap Vermeye Çalıştığı 5 Büyük Soru*

- 1 Gezegenler Nasıl Oluşur?
- 2 Evrende (şimdilik galaksimizde) hangi tür gezegenler var?
- 3 Gezegenler zamanla nasıl evrimleşiyor?
- 4 Güneş Sistemimiz nadir bulunabilecek bir gezegen sistemi midir?
- 5 Dünya nadir bir bulunabilecek bir gezegen midir?
- 6 **Bonus:** Evrende yalnız mıyız?

* <https://rockyworlds.wordpress.com/2018/04/08/the-five-biggest-questions-in-exoplanet-science-post-1-6/>